

RZ Select



Preporuke za tehnologiju uzgoja kupusnjača
Novi sortiment kupusnjača s otpornošću na Fusarium
Noviteti karfiola i ostalih kupusnjača



Kako odrediti optimalan period berbe kupusa



Faktori koji utiču na period gajenja kupusa

Ključ za uspešno gajenje kupusa je hibrid, koji se uklapa u vašu tehnologiju gajenja i odgovara potrebama tržišta i očekivanjima proizvođača. Jedna od najvažnijih odlika hibrida kupusa je dužina vegetacije. Vegetacija zavisi od nekoliko faktora i važno ih je upoznati.

Pod vegetacijom se podrazumeva period, u danima, od datuma rasadišvanja do berbe (tehnološke zrelosti). Tipična vegetacija hibrida se utvrđuje tokom ogleda, ali ukoliko se hibrid gaji u različitom periodu, vegetacija će odstupati od one koja je naznačena. Imajući ovo u vidu, vegetacija hibrida koja je određena standardom, može biti samo normativna vrednost i bolje je obratiti pažnju na razlike između vegetacija sličnih hibrida kada planirate period rasađivanja. Na primer

Multima RZ je 7-10 dana kasnija od Tacome RZ.

Ako želite da postignete idealno vreme berbe, ono koje vaše tržište zahteva, neophodno je uzeti u obzir nekoliko faktora, a to su: kvalitet rasada, tehnologija gajenja, periodi gajenja i vremenski uslovi.

Rasad bi trebalo da bude zdrav, dobro ukorenjen i pravilno razvijen. Ovo je najvažnije za dobar start nakon rasađivanja, ujedno od kvaliteta rasada zavisi i dužina vegetacije. Početak može biti veoma težak ako se rasade biljke koje imaju slabo razvijen korenov sistem ili su bolesne. Takođe, možemo videti razliku između upotrebe "čupanog" rasada, biljaka iz kontejnera ili supstratnih kocki. Rasađivanje "čupanog" rasada produžava period vegetacije.



Period gajenja:

najbitniji su dužina dana i intenzitet osvetljenja. Povećanje dužine dana i intenziteta svjetlosti stimulišu rast i obrnuto, smanjenje ovih faktora usporava rast kupusa. Na primer Gintama RZ može biti spremna za berbu za 85 dana, ukoliko je rasadlena u aprilu, ali ako je rasadlena sredinom jula, stiže za berbu posle 95-100 dana.

Vremenski uslovi mogu biti veoma stresni za useve, kao što su suviše visoka ili niska temperatura, suša ili preobilne padavine. Zbog stresa, rast hibrida kupusa se usporava ili u ekstremnom slučaju prestaje. Ovi kritični periodi mogu da produže vegetaciju za 10 do 14 dana.

Tehnologija gajenja:

kvalitetan rasad i dobro odabran datum rasađivanja su neophodni za

dobar početak uspešne proizvodnje. Ali pored toga, navodnjavanje i prihrana takođe utiču na dužinu vegetacije i datum berbe. Što se navodnjavanja i prihrane tiče, uvek je potrebno znati šta hibridu stvarno treba, jer nedostatak kao i višak navedenog mogu biti štetni.

Na primer, ako proizvodite Multimu RZ za svežu potrošnju, količina dodatog azota bi trebalo da bude 30% niža od proseka (obično 120 kg N/ha je potrebno da se doda u teško do srednje teško zemljište) zbog snažnog porasta i dobrog korenovog sistema koji ovaj hibrid ima. Takođe, usled smanjenog azota, sam kvalitet će biti bolji i oblik glavice će biti spljošteniji. Što se tehnologije tiče, posebnu pažnju treba obratiti na gustinu biljaka. Gušći sklop dovodi do manjih glavica

(ali ne uvek i manjeg prinosa!) i do duže vegetacije. Ovaj faktor takođe ima uticaja i na oblik glavice, na primer Multima RZ može da razvije više zaobljenu glavicu u gustom sklopu. Ređi sklop utiče na obrazovanje veće glavice i kraću vegetaciju.

U slučaju Gintame RZ, gust sklop sa oko 45.000 biljaka po hektaru ili više, daje glavice mase 1,5 do 2,5 kg (sa navodnjavanjem), što je odgovarajuće za pijace, dok u ređem sklopu (30.000 do 35.000 biljaka po hektaru) daje veće glavice mase 4-5 kg, što je dobro za preradu.

Za više informacija o načinu gajenja, molimo vas kontaktirajte agronome RZ Agra.

Karfiol



Celeritas RZ F1

- Rani hibrid, ima 2-4 dana dužu vegetaciju od Opaala
- Formira lepu, kompaktnu, snežno belu glavicu, nije osetljiv na promenu boje (ružičasta boja cvasti)
- Prema iskustvu proizvođača, odlikuje se odličnom otpornošću na stresne uslove i sigurnom proizvodnjom
- Prvenstveno se preporučuje za gajenje u plasteniku, ali je moguće i na otvorenom sa agrilom

Preporučeni broj biljaka po ha:

35.000 – 50.000

(58 cm x 50 cm, 50 cm x 45 cm)

Divita RZ F1

- Odlične rezultate daje u različitim vremenskim uslovima. Ima visoku toleranciju na hladan prolećni period, kvalitet glavice je kao i kod vodećih hibrida srednje rane vegetacije
- Vegetacija je 65-68 dana, 4-7 dana raniji u odnosu na Chambord
- Formira glavicu izuzetnog kvaliteta, prosečne mase 0.9-1.8 kg
- Biljka je kompaktan, dobro podnosi gušći sklop. Odlične rezultate daje na otvorenom polju uz primenu intenzivne tehnologije kao i u zaštićenom prostoru
- Dobre rezultate daje i na teškim i na lakinim zemljištima, siguran je za proizvodnju u uslovima hladnog proleća

Sadnja: u zaštićenom prostoru od 20. februara, a na otvorenom polju, uz pokrivanje agrilom od 20. marta. Poslednji preporučeni termin je sredina aprila. Za jesenju proizvodnju na otvorenom preporučuje se rasađivanje od 15. jula do 10. avgusta.

Preporučeni broj biljaka po ha: 35.000 – 45.000

(60 cm x 50 cm, 50 cm x 45 cm)

Adelanto RZ F1

- Vegetacija je nekoliko dana duža od Divite, veoma dobro pokriva glavicu, odličnog je kvaliteta
- Listovi su veliki, prekriveni voštanim prevlakom, biljka je oko 10 cm viša i robusnija u odnosu na Divitu
- Sadnja: od 20. marta do 20. aprila za ranu proizvodnju na otvorenom i od sredine jula do sredine avgusta za jesenju

Preporučeni broj biljaka po ha:

35.000-43.000

(60 cm x 50 cm, 50 cm x 45 cm)

Chambord RZ F1

- Omiljeni karfiol u segmentu srednje ranih hibrida, vegetacije 70-74 dana, koji daje dobre rezultate u različitim vremenskim uslovima
 - Preporučeni period berbe je maj-jun i od kraja septembra do novembra. Ne preporučuje se berba u toku leta jer može doći do nedostatka kalcijuma
 - Glavica je kompaktna, teška i bela kao sneg, lako se bere i pakuje
 - Uspravno lišće savršeno štiti glavicu mase 1.5 kg
 - Namenjen za svežu potrošnju
- Sadnja:** od sredine marta do sredine aprila i od kraja juna do 10. avgusta
- Preporučeni broj biljaka po ha:**

25.000-35.000

(65cm x 60cm, 60cm x 55cm)



Karfiol



Santamaria RZ F1

- Najomiljeniji hibrid među proizvođačima već godinama
- Listovi su uspravni, odlično pokrivaju glavicu tokom cele vegetacije, glavica je snežno bela, mase 2.5-3.0 kg, nije osetljiv na promenu boje (ružičasta boja cvasti) i nedostatak kalcijuma
- Vegetacija 78-82 dana u letnjem periodu i 85-95 dana u jesen, nakon rasađivanja
- Pouzdan hibrid koji se može gajiti od proleća do kasne jeseni, izvanredno tolerantan na visoke temperature što letnju proizvodnju čini sigurnom
- Odličan kvalitet glavice ima i u nepovoljnim uslovima gajenja
- Pogodan je za upotrebu u svežem stanju, industrijsku preradu i skladištenje u hladnjačama

Sadnja: od aprila dokrajja jula.

Preporučeni broj biljaka po ha: 23.000

– 33.000

(70 cm x 60 cm sau 60 cm x 60 cm)

Stabilis RZ F1

- Univerzalan hibrid, raniji od Santamarie oko 5-7 dana – u letnjem periodu vegetacija je 75 dana, 80 dana u jesen
 - Glavica je kompaktna, lepog i pravilnog oblika i u letnjim mesecima, nije osetljiv na pojavu promene boje (ružičasta boja cvasti) i rubnu palež
 - Kompaktna i teška glavica veoma dobro podnosi transport, dugo zadržava svežinu i kvalitet
 - Biljka je srednje bujna, spoljašnji listovi su uspravni, dobre rezultate daje i u gustom sklopu. Preporučuje se intenzivna tehnologija gajenja (gusti sklop, navodnjavanje, prihrana)
 - Nije osetljiv na nedostatak kalcijuma
 - Namenjen je proizvođačima koji mogu da primene polu-intenzivnu ili intenzivnu tehnologiju gajenja
- Sadnja:** od 20. marta do kraja aprila i od sredine juna do 10. avgusta, za svežu potrošnju
- Preporučeni broj biljaka po ha:** 28.000-40.000
(55cm x 60cm sau 40cm x 60cm)

Cercy RZ F1


- Sazreva 3-7 dana posle Santamarie, vegetacija u letnjem periodu 85 dana i 90-95 dana tokom jeseni
- Lisna masa je veća u odnosu na Santamariu, lišće je više za 10 cm, sa voštanom prevlakom
- Glavica je kompaktna, snežno bele boje, dobro podnosi visoku temperaturu, nije osetljiv na promenu boje (ružičasta boja cvasti)
- Kao i Santamaria, izvanredno tolerantan na visoke temperature i ako se seju zajedno obezbeđuje se kontinuitet berbe
- Tolerantan je na bolesti
- Korenov sistem je jak, dobro razvijen, dobro uspeva na različitim tipovima zemljišta
- Cercy je namenjen profesionalnim proizvođačima, ali ga uspešno mogu gajiti i hobi proizvođači

Sadnja: od kraja marta do 20. jula, namenjen je za potrošnju u svežem stanju i industrijsku preradu.

Preporučeni broj biljaka po ha:

23.000 – 33.000

(70 cm x 60 cm sau 50 cm x 60 cm)



Dexter RZ F1

- Univerzalan hibrid, jednostavan za proizvodnju, sa odličnim kvalitetom glavice koja je dobro pokrivena
- Vegetacija 75 dana u letnjem periodu i 85 dana u jesen, berba je od juna do novembra
- Tolerantan na plamenjaču, čak se ni u jesenjem periodu ne pojavljuju simptomi plamenjače
- Ima veoma snažan korenov sistem i zbog toga se može gajiti i na lošijim zemljištima
- Lako se bere, glavice se lako dele na manje delove koji su u prečniku 4-6 cm, što ga čini idealnim za preradu, industriju

Sadnja: od početka aprila do kraja jula, berba od juna do novembra

Preporučeni broj biljaka po ha:

28.000 – 40.000

Casper RZ F1 ▼

- Jedan od najuspešnijih hibrida za letnju i jesenju berbu
- Casper ima glavice vrhunskog kvaliteta, snežno bele boje
- Ostvaruje dobre rezultate i u lošijim proizvodnim uslovima, široko lišće odlično pokriva glavice i preko 2.0 kg
- Berba krajem leta i tokom jeseni
- Vegetacija 85 dana u letnjoj proizvodnji, 95 dana u jesenjoj
- Pogodan i za preradu

Sadnja: od kraja marta do sredina aprila i od početka juna do sredina jula

Preporučeni broj biljaka po ha:

25.000 – 35.000



Karfiol



Castellum RZ F1

- Hibrid koji se lako gaji, odličan za proizvođače koji gaje karfiol u ekstenzivnim uslovima. Tolerantan na niske temperature
- Vegetacija 90-95 dana, berba od septembra do novembra
- Tolerantan na stresne uslove zahvaljujući vrlo snažnom i dobro razvijenom korenovom sistemu
- Nije osetljiv na bolesti, dobar je i za bio proizvodnju
- Kompaktna glavica mase do 3.0 kg odlično je pokrivena brojnim listovima

Sadnja: od početka juna do kraja jula, odlični rezultati se mogu dobiti i ako se rasađuje između 20. marta i 20. aprila

Preporučeni broj biljaka po ha: 23.000 – 32.000

Romanesco karfiol

Puntoverde RZ F1

NOVO!

- Vegetacija 80 dana u letnjoj proizvodnji, 90 dana u jesen
- Biljka je snažna, dobro razvijena, uspravni listovi
- Glavica je intenzivno zelene boje, veoma atraktivnog izgleda
- Odličnog je kvaliteta, dobro uspeva i u letnjem periodu
- Puntoverde RZ je savršen izbor za letnju i jesenju berbu

Preporučeni broj biljaka po ha: 30.000

– 37.000



Brokoli



Agassi RZ F1

- Vrhunski hibrid zapotrošnju u svežem stanju I preradu
 - Najbolji, najpouzdaniji hybrid za letnju proizvodnju
 - Vegetacija 70-75 dana
 - Cvast je tamnozelene boje, vrlo kompaktna i ujednačena, mase 700-1300 g
 - Nije osetljiv na promenu boje
 - Obrazuje 5-6 sekundarnih zaperaka
- Sadnja:** od kraja marta do početka avgusta
- Preporučeni broj biljaka po ha:**
30.000-40.000


Monfils RZ F1

- Najnoviji hibrid namenjen za svežu potrošnju
 - Vegetacija 75 dana
 - Glavice su tamnozelene boje, kompaktne, mase 800-1500 g
 - Obrazuje cvast odličnog kvaliteta, pravilnog oblika i pri višim temperaturama
 - Biljka je srednje bujna, obrazuje 4-6 sekundarnih zaperaka
 - Dobro se čuva u svežem stanju
 - Namenjen za berbu krajem leta i tokom jeseni
- Preporučeni broj biljaka po ha:**
35.000-40.000

Zeleni karfiol

Vitaverde RZ F1 ▾

- Prvi zeleni karfiol koji je pogodan i za letnju i za jesenju berbu (od jula do kraja oktobra, u kontinuitetu)
 - Vegetacija 75 dana
 - Ima snažne, uspravne listove
 - Kompaktna i teška glavica lako se bere i pakuje
- Sadnja:** od aprila do kraja jula
- Preporučeni broj biljaka po ha:**
30.000 – 35.000



Beli kupus



Jetma RZ F1

- Vegetacija 53 dana, najraniji hibrid, obrazuje okrugle, lepo popunjene glavice, mase 0.8-1.5 kg, prijatnog ukusa, sve to čini ga omiljenim hibridom na tržištu kupusa
- Donji listovi su kompaktni i zbog toga odlično podnosi gustu sadnju
- Dobro podnosi promenjlive prolećne uslove, siguran hibrid
- Namanjen za ranu prolećnu proizvodnju u plastenicima i niskim tunelima, ali dobre rezultate daje i na otvorenom polju

Sadnja: u negrejanim plastenicima od sredine februara i na otvorenom od sredine marta do sredine aprila uz pokrivanje agrilom

Preporučeni broj biljaka po ha:
45.000-75.000

Lemma RZ F1 ▲

- Rani hibrid brzog porasta, vegetacije 58 dana
- Obrazuje okrugle glavice, koje zadržavaju pravilan oblik i u uslovima hladnog proleća i lošijeg provetrvanja, ima visoku otpornost na procvetavanje
- Prosečna masa glavice je 1.0-1.8 kg, veoma je stabilan hibrid, period berbe je 7-10 dana
- Glavica je sveže zelene boje i posle 4-5-og sloja listovi su zeleni, kočan je kratak. Listovi su tanki, prijatnog, slatkastog ukusa
- Lišće je prekriveno voštanom prevlakom, ima visoku otpornost na bolesti
- Biljka je umerene bujnosti, može se gajiti i u gušćem sklopu, preporuka je 5.5-7.0 biljaka/m², u zavisnosti od proizvodnih uslova

Rayma RZ F1

- Vegetacija 56 dana, rani hibrid za prolećnu i ranu letnju berbu
- Glavice su prosečne mase 1.3-1.8 kg, okrugle i lepe, sveže zelene boje
- Dobro podnosi temperaturna kolebanja
- Rayma je hibrid za gajenje na otvorenom polju, rasađuje se od sredine marta do kraja aprila. Može se gajiti sa Ademom zbog slične tehnologije gajenja i tako obezbediti duži period berbe

Preporučeni broj biljaka po ha:

40.000-50.000



Cilema RZ F1

- Srednje rani hibrid namenjen za preradu i svežu potrošnju
 - Vegetacija 70-75 dana
 - Prosečna masa glavice je 2.0-3.5 kg
 - Dugo čuva svežinu u polju, stabilan hibrid
 - Glavice su okrugle, atraktivne svetlozelene boje, prijatnog ukusa
 - Može se gajiti kao osnovna kultura, ali i postrno
- Sadnja:** od sredine marta do početka maja, a za jesenju berbu sadi se tokom jula

Preporučeni broj biljaka po ha:

30.000-40.000



Adema RZ F1 ▼

- Adema RZ je odličan izbor za ranu proizvodnju na otvorenom.
- Vegetacija 58-60 dana od rasađivanja, veoma stabilan, dobro se čuva u polju što omogućava dug period berbe
- Prosečna masa glavice je 1.0-1.3 kg na početku berbe, a oko 65-og dana može dostići 1.3-2.0 kg
- Ima lepu okruglu glavicu, atraktivne tamnozelene boje listova
- Dugo čuva svežinu, dobro podnosi stresne uslove što ga čini pogodnim za transport i prodaju u supermarketima
- Vrlo tolerantan na stresne uslove u ranom prolećnom periodu

Sadnja: od sredine marta do sredine aprila i za postrnu setvu od početka do 20. avgusta

Preporučeni broj biljaka po ha: 40.000-50.000



Beli kupus

Naoma RZ F1

- Siguran izbor za drugi rok setve
- Vegetacija 80 dana
- Prosečna masa ploda 2.0-4.0 kg
- Glavice su blago spljoštene, na kraju vegetacije okrugle
- U poređenju sa Tacomom listovi su malo deblji, zbog toga bolje podnosi transport i skladištenje
- Naoma RZ je odličan izbor za upotrebu u svežem stanju i za industrijsku preradu
- Dobro podnosi sušu i visoke temperature, zato je namenjen za letnju i jesenju proizvodnju

Preporučeni broj biljaka po ha:

35.000-40.000



RZ 30-270 F1

otporan na Fusarium

NOVO!

- Srenje rani hibrid, vegetacije 75 dana, namenjen za svežu potrošnju
- Listovi su prekriveni voštanom prevlakom, ima odličnu otpornost na bolesti, otporan na Fusarium
- Glavice su blago spljoštene, prosečne mase 2.0-3.0 kg
- Berba je od juna do novembra
- U letnjem periodu preporučuje se navodnjavanje

Preporučeni broj biljaka po ha: 38.000-47.000



Tacoma RZ F1



- Vegetacija 75 dana, lako se gaji, odličnog kvaliteta
- 3-4 sloja ispod površine listovi su još tamnozelene boje, listovi su tanki, glavice su prosečne mase 1.3-2.5 kg
- Ima snažan, dobro razvijen korenov sistem, zbog toga dobro podnosi sušu i visoku temperaturu i odlično se prilagođava različitim klimatskim uslovima
- Otporan je na Fusarium, nije osetljiv na gljivična oboljenja i trips, veoma dobro podnosi gajenje u monokulturi, daje siguran prinos
- Odlično reaguje na gušću sadnju, ali može se saditi i u ređem sklopu, kod gušće sadnje, u početnoj fazi gajenja koristi se manja količina azota od normalne preporučene količine
- Ima prijatan, slatkast ukus, nema tešku aromu. Odličnog je kvaliteta, po-djednako dobar i za upotrebu u svežem stanju i za preradu (kišeljenje)

Sadnja: od marta do 1. avgusta, berba od juna do novembra

Preporučeni broj biljaka po ha: 35.000-45.000



Multima RZ F1



- Vegetacija 80 dana
- Glavice su blago spljoštene, kompaktne, prosečne mase 1.5-3.5 kg
- Odličan izbor za upotrebu u svežem stanju, za salatu, kao i za preradu (kišeljenje)
- Glavicu čine tanki listovi, fine strukture, prijatnog, slatkastog ukusa, kočan je kratak
- 4-5 slojeva listova su tamnozelene boje, zbog toga glavica i posle nekoliko dana izgleda sveže i atraktivno
- Spoljašnji listovi brzo pokriju zemljište, što povoljno utiče na održavanje vlažnost i smanjenje razvoja korova
- Multima RZ je stabilan hibrid, ima snažan korenov sistem, dobro rezultate daje i na lošijim zemljištima
- Otporan je na Fusarium, nije osetljiv na gljivična oboljenja i Xanthomonas, može se gajiti u monokulturi
- Preporučuje se maksimalna upotreba 130kg N/ha i broj biljaka po ha 38.000, da bi se dobila glavica atraktivna za markete/pijace
- Univerzalan hibrid, odličnog kvaliteta i u topлом letnjem periodu i u hladnijem jesenjem

Sadnja: od marta do kraja jula

Preporučeni broj biljaka po ha: 35.000-42.000 zavisi od namene, odnosno vrste tržišta.





Gintama RZ F1 (RZ 30-282) ▲

Otporan na Fusarium

NOVO!

- Vrlo fleksibilan višenamenski hibrid, odličan za svežu potrošnju, kišeljenje i skladištenje. Može se uspešno gajiti kao osnovna kultura, ali i postrno
 - U optimalnim proizvodnim uslovima, nakon 85 do 90 dana, glavice su mase oko 2.0 kg. U ređem sklopu i proizvodnji za preradu, nakon 115-120 dana glavice dostižu masu 4.0-4.5 kg
 - Nije osetljiv na pucanje, veoma je stabilan, može dugo ostati u polju zadržavajući odličan kvalitet. U praksi period berbe traje čak 30-40 dana
 - Iskustvo pokazuje da Gintama RZ rasađena u prvoj dekadi jula sazreva u toku jeseni i može se vrlo uspešno skladištiti do marta
 - Glavice su okrugle do blago spljoštene, vrlo atraktivne i lako se pakuju u transportne kutije
 - 5-7 slojeva lišća ima zelenu boju i daju glavicama posebnu privlačnost i svež izgled, čak i nakon dugotrajnog skladištenja
 - Glavica se sastoji od glatkih, kompaktnih slojeva lišća, prijatnog, slatkastog ukusa
 - Lako se priprema za kišeljenje, kočan se uklanja jednostavno, a u fermentaciji ima minimalan kalo (gubitak)
 - Dobro razvijen, robustan korenov sistem veoma povoljno utiče na usvajanje hranljivih materija i brz porast. Otporan na Fusarium
 - Lišće je srednje bujno i glavici od 2.0 kg pruža dobru zaštitu od mehaničkih oštećenja. Nije osteljiv na tripse (nema potrebe za primenom hemijskih sredstava)
 - Ima izraženu voštanu prevlaku, dobre rezultate daje u uslovima suve kontinentalne klime. Nije osetljiv na gljivične i bakterijske bolesti
- Sadnja:** od početka marta do sredine jula, kao glavni i postrni usev
- Preporučeni broj biljaka po ha:** 30.000-37.000 bez navodnjavanja, 35.000-45.000 u uslovima intenzivne proizvodnje

Secoma RZ F1

Otporan na Fusarium

(RZ 30-283)

NOVO!

- Novi, višenamenski hibrid odličnog kvaliteta, namenjen je za upotrebu u svežem stanju i preradu, dobre rezultate daje u uslovima intenzivne proizvodnje, ali i u lošijim proizvodnim uslovima
- Vegetacija je 90 dana, berba od sredine leta do kasne jeseni, siguran izbor i za drugi rok
- Glavice su okrugle, prosečne mase 2.5-5.0 kg
- Preporučuje se gušći sklop i manja upotreba azota kod proizvodnje glavica za svežu potrošnju, markete/pijace
- Glavica je bela nakon nekoliko slojeva lišća, kočan je kratak, u preradi ima minimalan gubitak
- Srednje bujna biljka dobre rezultate daje i u uslovima kada nema navodnjavanja
- Otporna na Fusarium

Preporučeni broj biljaka po ha:

32.000-45.000





Septima RZ F1 ▲

(RZ 30-263)

NOVO!

- Visokorodni hibrid za proizvođače koji istovremeno žele i dobar kvalitet i visok prinos!
- Vegetacija je 120 dana, može da skladišti do februara
- Glavice su prosečne mase 5.0-8.0 kg, u zavisnosti od primenjene tehnologije gajenja i sklopa biljaka
- Glavice su blago spljoštene, kočan je srednje izražen. Nekoliko ovojnih slojeva ima zelenu boju, ima kvalitetnu unutrašnju strukturu i kompaktnost
- Snažan, dobro razvijen korenov sistem i robusno lišće omogućavaju intenzivan rast i pozitivno uticu na smanjenje razvoja korovskih vrsta, tako da se može gajiti u polu-intenzivnim i ekstenzivnim uslovima proizvodnje
- Listovi imaju izraženu voštanu prevlaku, plavičaste su boje, nije osetljiv na gljivične bolesti i tripse. Otporan je na Fusarium
- Optimalan period berbe je od sredine avgusta do kraja oktobra
- Preporučujemo Septimu proizvođačima koji žele hibrid dobrog kvaliteta, koji daje veliki prinos i jednostavan je za proizvodnju

Sadnja: od aprila do juna

Preporučeni broj biljaka po ha: 25.000-32.000

Otporan na
Fusarium

Selma RZ F1

- Dobro poznat i veoma popularan hibrid za preradu
 - Vegetacija 100-110 dana
 - Veoma dobro podnosi nepovoljne uslove tokom leta (suša i visoka temperatura)
 - Kočan je kratak, struktura glavice idealna za kišeljenje
 - Prosečna masa glavice je 3.5-6.0 kg, što zavisi od uslova proizvodnje
- Sadnja:** od kraja aprila do kraja juna
- Preporučeni broj biljaka po ha:** 28.000-32.000





Zuleima RZ F1 ▼

- Vegetacija 120 dana
- Formira blago spljoštene glavice, odličnog kvaliteta, listovi su fine strukture, sadrži visok procenat suve materije, vrlo prijatnog ukusa
- Masa glavice se kreće između 3.5-8.0 kg u zavisnosti od tehnologije gajenja
- Daje dobre rezultate i u nepovoljnim, stresnim uslovima proizvodnje
- Odličan hibrid za preradu (kišeljenje), kraće skladištenje i upotrebu u svežem stanju

Sadnja: od maja do 20. juna

Preporučeni broj biljaka po ha:

25.000-32.000

Mucsuma RZ F1

Otporan na Fusarium

- Vrhunski hibrid za skladištenje, odličnog kvaliteta, veoma lako se gaji
- Vegetacija 125 dana bez navodnjavanja i 115 dana sa navodnjavanjem
- Glavice su okrugle, prosečne mase 1.5-4.0 kg, listovi su tamnozelene boje do 6-8 sloja, što glavicama daje svež izgled i nakon dužeg skladištenja
- Zbog visokog sadržaja suve materije dobro se skladišti – u hladanjačama se može čuvati do kraja maja bez gubitka kvaliteta
- Ima finu spoljašnju strukturu, lep, prijatan ukus
- Glavice se nalaze relativno visoko, zbog toga je laka berba, lako se gaji, čak i u monokulturi
- Otporan je na Fusarium i tripse
- Mucsuma daje dobre rezultate i u nepovoljnim uslovima proizvodnje – bez navodnjavanja daje relativno velike prinose
- Odličan izbor za upotrebu u svežem stanju i skladištenje
- Kod ređeg sklopa glavice dostižu masu od 3.5-4.5 kg, što ih čini idealnim za preradu i kišeljenje

Sadnja: od maja do sredine juna

Preporučeni broj biljaka po ha: 28.000-42.000





Kelj

Ancoma RZ F1

Odporan na Fusarium

Hibrid za jesenju berbu, vrlo pouzdan, odličnog kvaliteta
Vegetacija 110-120 dana
Glavice su lepe, blago spljoštene, prosečne mase 1.5-4.0 kg
Veličina glavice zavisi od sklopa i termina sadnje

Listovi su tanki, veoma fine strukture
Otporannost na Fusarium daje dodatnu sigurnost proizvodnji, nije osetljiv na gljivična oboljenja i trips
Bela boja, slatkast ukus i visok sadržaj suve materije čine ga idealnim za preradu

Odličan izbor za upotrebu u svežem stanju, skladištenje i preradu (kišeljenje)

Sadnja: od aprila do kraja juna

Preporučeni broj biljaka po ha: 28.000-35.000

Salima RZ F1

- Dobro poznati, veoma rani hibrid kelja
 - Vegetacija 55-60 dana nakon rasadijanja
 - Glavice su kompaktne, mase 1.0-2.0 kg, izuzetno prijatanog, blagog ukusa (nije ljut)
 - Preporučuje se za proizvodnju u zaštićenom prostoru i za ranu prolećnu proizvodnju na otvorenom
- Sadnja:** druga polovina februara za negrejane plastenike i od sredine marta do kraja aprila za proizvodnju na otvorenom
- Preporučeni broj biljaka po ha:**
40.000-55.000



Morama RZ F1

- Vegetacija je 100 dana, berba od septembra do decembra
 - Glavica je okrugla, prosečne mase od 2.0-3.5 kg, listovi su blago smežurani kada sazri
 - Njegov izuzetno prijatan ukus i visok sadržaj suve materije ga čine ne samo pogodnim za pijace, već i za preradu i skladištenje
 - Lako se gaji, visoko pouzdan hibrid koji može da izdrži hladnu jesen i niže temperature
- Sadnja:** od maja do 20. jula, u zavisnosti od namene
- Preporučeni broj biljaka po ha:**
30.000-40.000



Crveni kupus



Redma RZ F1

- Fleksibilan, pouzdan, srednje rani hibrid
 - Vegetacija 80 dana
 - Glavice su okrugle, mase 1.5 – 3.0 kg, intenzivno crvene boje, dugo čuvaju svežinu u polju
 - Uspešno se može gajiti kao glavni usev, ali i postrno (nakon ranog parajza i kupusa), što ga čini popularnim među proizvođačima
 - Pogodan za potrošnju u svežem stanju, kraće skladištenje i industrijsku preradu
- Sadnja:** od marta do kraja jula
- Preporučeni broj biljaka po ha:**
30.000-40.000

Resima RZ F1

- Vegetacija 120 dana
 - Obrazuje glavice izduženog oblika, mase 2.0-4.0 kg, prekrivene voštanom prevlakom, "tamno-indigo plave" boje
 - Pogodan za skladištenje zbog svog visokog sadržaja suve materije, ali i za preradu
 - Dobro rezultate daje i u lošijim uslovima gajenja, siguran je i stabilan hibrid
- Sadnja:** od početka maja do sredine juna
- Preporučeni broj biljaka po ha:**
28.000-35.000

Rexoma RZ F1

- Popularan jesenji hibrid, za potrošnju u svežem stanju, skladištenje i preradu
- Vegetacija 120 dana
- Glavice su prosečne mase 2.0-3.5 kg, okrugle, tamnocrvene boje, listovi su tanki, fine strukture, kočan je vrlo kratak
- Čvrste glavice čine ga pogodnim za skladištenje do maja bez gubitaka u kvalitetu
- Odlične rezultate daje i u lošijim uslovima gajenja što ga čini sigurnim izborom
- Može se gajiti i bez navodnjavanja
Sadnja: od početka aprila do sredine juna

Preporučeni broj biljaka po ha:

27.000-40.000



Keleraba



Templin RZ F1

- Razvija uspravnu, zdravu lisnu masu i ima izuzetnu otpornost na stresne uslove
 - Brzo razvija stablo, ne menja pravilan oblik i dugo zadržava svežinu
 - Nije sklon povijanju
- Sadnja:** u zaštićenom prostoru od februara i za najraniju sadnju na otvorenom polju

Nacimiento RZ F1

- Izuzetno rani hibrid koji je lak za proizvodnju i daje odličan kvalitet
 - Lisna masa je snažna i uspravna, dobre rezultate daje i u nepovoljnim uslovima gajenja tokom januara i februara
 - Stablo je blago spljošteno, svetlozelenе boje
- Sadnja:** u najranijem prolećnom periodu, berba do aprila

Volturno RZ F1

- Već godinama je najbolji hibrid za proizvodnju u letnjim mesecima
 - Lisna masa je snažna, uspravna, prekrivena voštanom prevlakom
 - Visoka tolerancija na bolesti
 - Veoma snažan korenov sistem daje sigurnost u proizvodnji čak i u lošijim, stresnim proizvodnim uslovima i na lošijim zemljиштima
 - Siguran hibrid čak i u poluintenzivnim uslovima gajenja, daje veliki prinos
 - Nije osetljiv na pucanje stabla, može dugo ostati u polju
- Sadnja:** od proleća do jeseni, kako u zaštićenom prostoru, tako i na otvorenom polju





Za više informacija o hibridima, tehnologijama
gajenja i porudžbinama molimo vas kontaktirajte:

Uvoznik i distributer:

za Srbiju: **RZ Agro d.o.o.**

Kvantaška pijaca lokal 11, Auto-put bb, 11 070 Novi Beograd

Tel: +381 11 6199 436 - Tel/Fax: +381 11 6309 002

e-mail: info@rz-agro.rs

www.rz-agro.rs

za Bosnu i Hercegovinu: **RZ B&H d.o.o.**

Laminci, 78407

dipl. ing. agr. **Dubravka Spasojević** - Tel: +381 63 470 620

e-mail: dubravka.spasojevic@rz-agro.rs

dipl. ing. agr. **Dinka Gušić** - Tel: +381 63 470 022

e-mail: dinka@rz-agro.rs

Ivan Komazec - Tel: +381 63 471 215

email: ivan@rz-agro.rs

Opisi, ilustracije, tehnološke preporuke i ostale informacije date u ovoj brošuri, na primer: datumi setve, sadnje, berbe, zasnovani su na iskustvima i rezultatima iz ogleda i prakse. Rijk Zwaan ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane upotrebom datih opisa, ilustracija, tehnoloških preporuka i ostalih informacija. Kupac, odnosno korisnik semena lično je odgovoran za adekvatno čuvanje (skladištenje) semena i procenu da li su proizvodi i tehnološke preporuke prikladni za upotrebu u planiranoj proizvodnji u datim lokalnim uslovima. Fotografije u ovoj brošuri prikazuju tipove kojima pojedini varijetet pripada. Fotografije ne predstavljaju garanciju i ne izražavaju ponasanje pojedinog varijeteta u lokalnim proizvodnim uslovima.